

Erdegeschichte.

Von

Dr. Melchior Neumahr.

Erster Band.

Allgemeine Geologie.

Mit 334 Abbildungen im Text, 15 Chromotafeln und 2 Karten
von E. Heyn, O. Peters, K. Poschinger, E. v. Ransonnnet, A. Swoboda u. a.

n. 29 Inv.


Neuer Abdruck.




Leipzig und Wien.

Verlag des Bibliographischen Instituts.





1890.




Archaeopteryx von Solnhofen (nach Dames). Nicht ganz $\frac{2}{3}$ der natürl. Größe. Vgl. Text, S. 45.




Ichthyornis aus der obern Kreide von Kansas (nach Marsh): a restauriertes Skelet, $\frac{1}{2}$ natürl. Größe; b Unterkiefer, von oben gesehen, mit den Zahngruben; c bifurkater Wirbel, von oben, und d, von unten gesehen. Vgl. Text, S. 49.




Toxaster complanatus (nach Desor). a Von der Seite, b von oben, c Scheitelapparat, d von unten. Vgl. Text, S. 45.



Crioceras Roemeri. Vgl. Text, S. 46.




Hippurites cornu vaccinum. Vgl. Text, S. 45.




Anſicht des Erdinnern und ſeines Zuſammenhanges mit den Vulkanen (Kopie nach Athanaſius Kircher).
Vgl. Text, S. 19.

A.



B.



DIE MARSHemisphären.

A. Nördliche Hälfte. B. Südliche Hälfte.





Meteorit von Krassnojarsk (Pallaseisen).




Meteorit von Kakova.

METEORITEN.




Trias
 Kreide
 Eocän
 Miozän
 Oberer Jura
 Lias und mittlerer Jura
 Kristallinischer Schiefer und paläozoische Bildungen

Profile aus den Alpen und dem Schweizer Jura (nach Heim).



Rand des Lavaströmes von 1872 (Blodlava) in einem Baumgarten. Auf der frischen Lava noch rauchende Fumarolen (nach einer Photographie von Sommer). Vgl. Text, S. 156.



Der Vesuv am 26. August 1872 (nach einer Photographie von Sommer). Vgl. Text, S. 156.



Getröselava des Vesuvius (nach einer Photographie). Vgl. Text. S. 161.



Polla in Kalabrien nach dem Erdbeben vom Jahre 1857 (nach Mallet).



Der Serapistempel von Puzzuoli. An den drei großen Säulen im Vordergrunde sind unter der Mitte die dunklern von den Bohrmuscheln angenagten Partien zu sehen. Vgl. Text, S. 353.



Terrassen des Tatarata-Beckens auf Neuseeland. Vgl. Text, S. 387.

VERGLEITSCHERUNG DES TEGERNSEE - GEBIETES WÄHREND DER EISZEIT.



Bibliographisches Institut in Leipzig.

Höhen in Metern.

Maßstab 1:300 000



Gletscherluft am Grindelwaldgletscher. Vgl. Text, S. 499.