

Erdegeschichte.

Von

Dr. Melchior Neumahr.

Zweiter Band.

Beschreibende Geologie.

Mit 581 Abbildungen im Text, 12 Chromotafeln und 2 Karten

von Th. Alphons, E. Heyn, O. Peters, K. Poschinger, E. v. Ransonnet, A. Swoboda u. a.


N^o 29 Inv.




Leipzig und Wien.

Bibliographisches Institut.

1890.




Silurische und devonische Tetrakorallen: 1. *Streptelasma*, aus dem obern Silur von Gotland, von der Seite — 2. von unten. (Nach Runtz.) — 3. *Cyathophyllum truncatum*, aus dem obern Silur von Gotland. — 4. *Omphyma subturbinatum*, aus dem obern Silur von Gotland, von der Seite — 5. durchgeschnitten. — 6. *Palaeocyclus porpita*, aus dem Obersilur von Gotland. — 7. *Cystiphyllum vesiculosum*, aus dem Devon der Gifel. (Nach Goldfuß.) — 8. *Gonio-phyllum*, aus dem obern Silur von Gotland, die Mündung mit vierteiligem Deckel verschlossen — 9. dasselbe von der Seite. (Nach Lindström.) Vgl. Text, S. 66.




SÄULENKAP AUF FRANZ-JOSEPHS-LAND.




KOHLENKALKABLAGERUNGEN IN DER KANAB-WÜSTE, ARIZONA (Nordamerika).




Branchiosaurus salamandroides, aus der Gaskohle von Mürschau
in Böhmen. (Nach A. Fritsch.) Vgl. Text, S. 155.




Phenacodus primaevus, aus der Puercogruppe Nordamerikas. (Nach Cope.)




Gerippe des Klippschafes.




Devonische Krinoiden aus der Gifel. (Nach Schulke.) 1. *Cupressocrinus inflatus*, vollständige Krone. — 2. *Cupressocrinus abbreviatus*, Kelch von unten. — 3. Derselbe Kelch ohne die Arme von oben, mit dem sogenannten Konsolidationsapparate — 4. Kelchdecke von *Coccoocrinus rosaceus*. — 5. *Lecythocrinus Eifolians*. — 6. *Hexacrinus anaglypticus*, Kelch ohne Arme. — 7. *Rhipidocrinus crenatus*. — 8. *Eucalyptocrinus rosaceus*. — 9. Derselbe, idealer Durchschnitt durch den Kelch. Vgl. Text, S. 119.




Tertiäre Schmetterlingsreste: 1. von Radoboj in Kroatien — 2. von Nig in der Provence. (Nach Scudder.)



Blodführende Ablagerungen der Talchirsichten aus dem nordöstlichen Teile der Indischen Halbinsel, mit Blöden von Turmalingranit, Gneiß, Hornblendeschiefer und Quarzit. (Nach Griesbach.) Vgl. Text, S. 193.



Verbreitung der jungen Kettengebirge. Vgl. Text, S. 656.





Großer Cañon des Colorado. (Nach Ives.) Vgl. Text, S. 716.